Mission Géodésique de l'Equateur :

Coléoptères Histérides.

par M. H. Desbordes.

---

1. **Saprinus** (subgen. **Euspilotus**) **Bourgeoisi**, nov. sp.

Ovatus, fortiter convexus, piceo-niger, parum nitidus. Caput punctulatum, stria nulla. Pronotum haud ciliatum, basi lateribusque punctatum, disco laevi. Elytra antice lateribusque laevia, dimidio postico sparse et leviter punctato; striis, subhumeralibus, externa basi valde notata, interna brevissima, humerali et prima dorsali parallelis; dorsalibus, secunda tertiaque æqualibus dimidiatis, prima et quarta brevioribus, hac antice hamata cum saturali haud juncta. Propygidium pygidiumque dense et leviter punctulata, hoc apice lævi haud insculpto. Prosternum basi triangulare, mox fortiter constrictum, striis divergentibus, sed antice parallelis, mesosternum marginatum parum punctatum, punctis vix perspicuis. Tibiæ anticæ septem denticulatæ. Long. 4 mm. (capite et pygidiis exclusis).

Type : un exemplaire recueilli en décembre ou janvier par le capitaine Noirel, attaché à la mission du colonel R. Bourgeois dans l'Équateur, à Baños (province de Tungurahua), 1,830 mètres d'altitude. — Coll. J. Bourgeois > Muséum de Paris.

Le prosternum de cette espèce, presque caréné en avant, et ses stries prosternales, parallèles dans leur tiers antérieur, la font entrer dans le sous-genre *Euspilotus* et dans la section de ce sous-genre caractérisée par les élytres unicolores. Cette section ne comprenait jusqu'ici que quatre espèces, dont *E. Bourgeoisi m.* se distinguera au moyen du tableau suivant :

1. Pronotum cilié. 4e strie dorsale des élytres réunie à la saturale. — Rép. Argentine..... *devius* Lew.
— Pronotum non cilié. 4e strie dorsale non réunie à la suturale. 2

2. Élytres ponctués jusqu'à la base..... 3
— Élytres lisses sur leur moitié antérieure..... 4

3. Ponctuation des élytres grossière et dense. Stries prosternales appendiculées; — Uruguay..... *myrmecophilus* Bickh.
— Ponctuation des élytres aciculaire, fine et rare sur les interstries. Stries prosternales simples. — Uruguay..... *limatus* Mars.

4. Taille petite : 2 mm. 5. Stries dorsales fortes, crénelées; strie subhumérale externe courte, basale, à peine distincte de la strie marginale. — Uruguay..... *gnathoncoides* Bickh.
— Taille grande : 5 millimètres. Stries dorsales fines, nullement crénelées; strie subhumérale externe assez longue, très distincte. — Équateur..... *Bourgeoisi*, n. sp.

2. **Saprinus** (subgen. **Euspilotus**) **laesus** Lew.

Lewis., *Ann. Mag. of Nat. Hist.* (7), VI, 1900, p. 288; *loc. cit.* (8), IV, 1909, p. 303.

Deux exemplaires provenant de Riobamba (Équateur), recueillis par le Dr G. Rivet en 1901.